Eine neue Oligota aus Java

(28ster Beitrag zur Indomalayischen Staphylinidenfauna)

von

Dr. Max Bernhauer.

Horn (Nied. Oesterr.).

Oligota Uyttenboogaarti nov. spec.

Eine winzige Art der Untergattung *Holobus* Sol. Schwarz, glänzend, eiförmig gewölbt, die Hinterleibsspitze nicht heller, die Fühler, Taster und Beine blassgelb, dünn behaart.

Kopf viel schmäler als der Halsschild, sehr kurz, äusserst fein und spärlich, kaum erkennbar punktiert. Fühler kurz, die dreigliedrige Keule stark abgesetzt, ziemlich gleichbreit, nur mässig kürzer als der übrige Teil der Fühler.

Halsschild hinten so breit als die Flügeldecken zwischen den Schultern, mehr als doppelt so breit als lang, nach vorn stark verengt, an den Seiten schwach gerundet, äusserst fein, kaum sichtbar und spärlich punktiert, stark glänzend.

Flügeldecken um die Hälfte länger als breit, zusammen deutlich breiter als lang, fein aber deutlich und mässig dicht punktiert.

Hinterleib stark zugespitzt, sehr fein und mässig dicht punktiert, am Hinterrande der vorderen Tergite mit kräftigen Längsstrichen dicht besetzt.

Von *chrysopa* Kr. durch geringere Grösse, andere Färbung, viel weitläufige Punktierung des Vorderkörpers und die Skulptur des Hinterleibes auffallend verschieden.

Länge 0.5 mm. Java, Buitenzorg, 1921. Ein einziges Exemplar, das ich der Güte des Herrn Dr. Uyttenboogaart verdanke.